

# Tratamiento del trastorno por uso de opioides en el Servicio de urgencias

## ¿SOY ELEGIBLE?

**Antes de comenzar Suboxone, debe tener síntomas de abstinencia:**

Suboxone puede hacer que se sienta enfermo si no está en abstinencia. **Estos son algunos de los síntomas más comunes que puede sentir en abstinencia:**



### En general, recomendamos comenzar Suboxone:

1. 12 horas después del consumo de heroína u opioides de prescripción (oxicodona, Vicodin).
2. 16 horas después de su última toma de OxiContin.
3. 48 horas después de su última toma de metadona.
4. Cuando su abstinencia esté en un nivel moderado. Lea la página dos para medir la gravedad de su abstinencia.

## QUÉ ESPERAR AL LLEGAR AL SERVICIO DE URGENCIAS

### FASE 1: Admisión

- Se le harán varias preguntas relacionadas al consumo de sustancias
- Contestar con la información más detallada sobre el consumo reciente y síntomas actuales ayudará al médico a proveer el mejor nivel de cuidados

### FASE 2: Comenzar Suboxone

- Se evalúa la medida de su nivel de abstinencia
- Monitoreo continuo de síntomas
- Se administra Suboxone
- Una vez que esté estable, el equipo de coordinación de cuidados del Servicio de urgencias proveerá un plan personal de seguimiento

### FASE 3: Después del Servicio de urgencias

- Revisará su plan de cuidados y los recursos adicionales que proveerá para apoyarle
- Comenzará su mantenimiento de medicamentos como indica su plan de cuidados
- El equipo de coordinación de cuidados dará seguimiento poco después de su visita al Servicio de urgencias

*\*Tome nota: El Servicio de urgencias no puede reponer su receta de Suboxone.*

## ¿ESTÁ LISTO PARA COMENZAR SUBOXONE?

Vaya a cualquiera de las dos ubicaciones con Servicio de urgencias:



**84th Avenue Neighborhood Health Center**  
2551 W 84th Ave, Westminster, CO 80031



**St. Anthony North Health Campus**  
14300 Orchard Pkwy, Westminster, CO 80023

Llame a su médico si tiene preguntas adicionales sobre si Suboxone es adecuado para usted.

# Subjective Opiate Withdrawal Scale (SOWS) – Escala subjetiva de abstinencia de opioides

**Instrucciones:** Recomendamos que, una vez que comience su abstinencia, mida sus síntomas con la siguiente tabla.

Esto le dará al equipo de tratamiento del Servicio de urgencias información valiosa para determinar el mejor nivel de cuidados para usted.

**Escala:** 0 = Nada    1 = Un poco    2 = Moderado    3 = Bastante    4 = Extremo

FECHA			
HORA			
SÍNTOMA	PUNTUACIÓN	PUNTUACIÓN	PUNTUACIÓN
1. Me siento ansioso			
2. Tengo ganas de bostezar			
3. Estoy sudando			
4. Mis ojos lagrimean			
5. Mi nariz está goteando			
6. Tengo piel de gallina			
7. Estoy temblando			
8. Tengo sofocos			
9. Tengo escalofríos			
10. Tengo dolor en los huesos y músculos			
11. Me siento inquieto			
12. Siento náuseas			
13. Siento que quiero vomitar			
14. Tengo tics musculares			
15. Tengo calambres estomacales			
16. Quiero tomar opioides ahora			
<b>TOTAL</b>			

**Abstinencia leve** = 1 – 10

**Abstinencia moderada** = 11 – 20

**Abstinencia severa** = 21 – 30

\*El mejor momento para la aplicación de Suboxone es durante la abstinencia moderada.